

Plan de traitement pour les jardins familiaux



Débourrement

Capito Cupro (tavelure) **½ sachet/5 l**
 +
Huile d'hiver Capito (ravageurs) **100 ml/5 l**



Avant fleur

Rondo Combi *
 (tavelure - oïdium) **1 sachet**
+ 1 flacon/5 l



Fin fleur

Rondo Combi *
 (tavelure - oïdium) **1 sachet**
+ 1 flacon/5 l
 +
Insegar L **7,5 ml/5 l**
 +
Alaxon Gold (insecticide)
 (chenilles – pucerons) **12.5 ml/5 l**
(traiter hors vol des abeilles)



Mi à fin mai

Rondo Combi *
1 sachet
+ 1 flacon/5 l



Mi-juin

Rondo Combi *
 (tavelure - oïdium) **1 sachet**
+ 1 flacon/5 l +
Alaxon Gold (insecticide)
 (Carpocapse) **12.5 ml/5 l**



Juillet

Armicarb Capito **15 g/5 l**
 (maladies de conservation – tavelure - oïdium)
 Répéter chaque 15 jours jusqu'à 3 semaines avant la récolte

* Possibilité d'utiliser le fongicide Systane C-WG à 7.5 g/5 l

Les intervalles de traitement contre les maladies doivent s'adapter aux conditions météo, à la pousse, et à la sensibilité aux maladies. En principe, chaque 10 à 15 jours d'avril à juin puis chaque 15 à 20 jours ensuite.

Soyez attentif au délai d'attente (délai entre le dernier traitement et la récolte), aux dosages. Une bonne protection de l'utilisateur lors de la préparation et de l'application est nécessaire. Se laver après un traitement.

Notice d'emballage :

Les descriptions de produits dans cette publication servent à une première information générale. Pour une application conforme des produits, les instructions figurant sur l'emballage (étiquette) font foi. Cette édition remplace les précédentes. Demeurent réservées les erreurs de texte ou d'impression.