

Plan de traitement pour les jardins familiaux



Débourrement

Capito Cupro (tavelure) **25 g/10 l**
 +
Huile d'hiver Capito (ravageurs) **200 ml/10 l**



Pleine fleur

Gesal fongicide **1 sachet/10 l**
 (tavelure – rouille grillagée)



Fin fleur

Gesal fongicide **1 sachet/10 l**
 +
Insegar M (insecticide)
 (pucerons - hoplocampe) **4 g/10 l**



Mi mai

Gesal fongicide **1 sachet/10 l**



Fin Mai -début Juin

Rondo Natura **30 g/ 10 l**
 (Psyllés)

Lorsque les pousses commencent à coller, par temps clair



Mi-juin

Gesal fongicide **1 sachet/10 l**
 +
Insegar M (insecticide)
 (chenilles) **4 ml/10 l**

Répéter la protection avec Rondo Combi chaque 15 – 20 jours,
 jusqu'à 3 semaines avant la récolte

Soyez attentif au délai d'attente (3 semaines entre le dernier traitement et la récolte) et aux dosages. Une bonne protection de l'utilisateur lors de la préparation et de l'application est nécessaire. Se laver après un traitement.

Notice d'emballage : les descriptions de produits dans cette publication servent à une première information générale. Pour une application conforme des produits, les instructions figurant sur l'emballage (étiquette) font foi. Cette édition remplace les précédentes. Demeurent réservées les erreurs de texte ou d'impression.