



<i>Quand traiter</i>	<i>maladies et ravageurs</i>	<i>solutions</i>	<i>Dosage 100 lt</i>
1. Avant débourrement	Pou de San José + divers ravageurs + divers champignons	Huile Blanche Omya + Oxycuivre 35	2 lt 125 g
2. Avant fleur	Tavelure + oïdium + moniliose + pucerons	Systane C + Alanto	150 g 20 ml
2a. Fruits à noyaux Pleine fleur	Moniliose + oïdium	Flint + Captane WDG Omya	10 g 125 g
3. Après fleur Chute des pétales	Tavelure + oïdium + chenilles	Systane C + Prodigy	150 g 35 ml
4. Mi- Mai	Tavelure + oïdium + pucerons	Flint + Captane WDG Omya + Alanto	10 g 125 g 20 ml
5. Début Juin	Tavelure + oïdium	Systane C	150 g
6. Fin Juin- Début juillet	Tavelure + oïdium + carpocapse	Flint + Captane WDG Omya + Prodigy	10 g 125 g 35 ml
7. Fin juillet – début Août	Tavelure + oïdium Maladie de conservation	Armicarb	240 g

Remarques :

a) En cas de bonne connaissance des ravageurs et d'un contrôle régulier des feuilles et fruits, il est possible d'adapter l'insecticide à la présence du ravageur.

b) Ce plan de traitement est adapté aux pommiers (fruits à pépins). Pour les autres espèces tenir compte des remarques ci-après : Pour les fruits à noyaux augmenter le Flint à 25 g

- Poirier: Traitements 1 à 5. A fin mai, les psylles sont combattus avec Vertimec gold (75 ml/100 l)
- Cerisier: Traitements 1, 2, 2a et 3. Contre la mouche de la cerise, mettre des pièges jaunes Rebell ou traiter lorsque les cerises jaunissent avec Alanto à 0.02 %
- Prunier: Traitements 1, 2, 2a, 3, 4 et 6.
- Abricotier: Traitements 1, 2, 2a et 3. Prodigy s'applique au traitement 3, comme unique insecticide.
- Pêcher: Traitements 1, 2, 2a et 3. Contre la cloque, Cuprofix 35 (0.188%) à la chute des feuilles et avant débourrement en février - mars.
- Cognassier: Traitements 1, 2, 2a. Contre les maladies du feuillage, appliquer 1 x Systane C et 1 x Flint + Captane durant la végétation.

Soyez attentif au délai d'attente (délai entre le dernier traitement et la récolte), au dosage et aux informations générales indiquées sur les étiquettes. Une bonne protection de l'utilisateur lors de la préparation et de l'application est nécessaire. Se laver après un traitement.